

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Canakinumab Inyección subcutánea de 150 mg

Para el tratamiento de la enfermedad de Still activa, incluyendo la enfermedad de Still's del adulto (AOSD) y la Artritis idiopática juvenil de inicio sistémico (SJIA)

Los Síndromes de Fiebres Periódicas (SFP) incluyen las siguientes enfermedades genéticas autoinflamatorias:

Fiebre Mediterránea Familiar (FMF)

Síndrome de Hiper IgD/Deficiencia de Mevalonato Kinasa (HIDS/MKD)

Síndrome Periódico asociado al receptor del Factor de Necrosis Tumoral (TRAPS)

Antes del tratamiento con canakinumab

- **Infecciones:** No debe ser tratado con canakinumab si tiene una infección activa que requiere intervención médica.
- **Vacunas:** Hable con su médico acerca de cualquier vacunación que pueda necesitar antes de comenzar el tratamiento con canakinumab.

Durante el tratamiento con canakinumab

- **Riesgo de Infecciones:** El uso de canakinumab se asocia con un mayor riesgo de infecciones, incluyendo infecciones serias.
- Si desarrolla una infección, puede ser necesario interrumpir su tratamiento con canakinumab. Informe de inmediato a su médico si tiene fiebre que dura más de 3 días u otros síntomas que pudieran deberse a una infección.
- Busque atención médica **inmediatamente** si presenta síntomas como:
 - Fiebre prolongada, tos o dolor de cabeza
 - Enrojecimiento localizado, calor o hinchazón de la piel
 - Tos persistente, pérdida de peso y fiebre baja
- **Síndrome de activación de macrófagos (MAS):** los pacientes con enfermedad de Still pueden desarrollar una condición llamada activación de macrófagos (un tipo de glóbulos blancos) síndrome (MAS), que puede poner en peligro la vida. Informe a su médico de inmediato si sus síntomas de la enfermedad de Still empeoran o empeoran la infección.
- **Embarazo:** Si recibió canakinumab mientras estaba embarazada, es importante que informe al médico o a la enfermera del bebé antes de que se le administren vacunas a su bebé. Su bebé no debe recibir vacunas vivas hasta al menos 16 semanas después de haber recibido su última dosis de canakinumab antes de dar a luz.

Indicación del Tratamiento:

Asegúrese de tener una LISTA DE TODOS LOS MEDICAMENTOS que está tomando al visitar a un profesional de la salud.

Nombre del paciente:

Para los niños: nombre del Padre / Tutor

Fecha de la primera dosis de canakinumab:

Dosis administrada de canakinumab

Nombre del médico:

Teléfono del médico:
